

DESIN BAC VIR

Descripción: BACTERICIDA/ FUNGICIDA/ VIRICIDA

Código: Q01.05.001

Revisión y Fecha: 18 11/06/2024

Características: Desinfectante concentrado de amplio espectro en base a amonio cuaternario. Combate los malos olores. Posee actividad bactericida ensayado frente a *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Listeria monocytogenes* y *Salmonella typhimurim*. Posee actividad viricida frente a *Poliovirus* tipo 1, *Adenovirus* tipo 5 y *Murine norovirus*. Posee actividad fungicida frente a *Candida albicans* y *Aspergillus brasiliensis*. Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas. Aplicación por personal profesional.

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente.
Color: Azulado.
Densidad: 1,04 ± 0,01 g/cc
Olor: Inodoro.
Valor de pH: 12,5 ± 0,5

Aplicaciones: Desinfectante concentrado de superficies no porosas y equipos. Adecuado para la desinfección de áreas críticas en la industria alimentaria e institucional. Uso ambiental y en la industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos. Aplicación por personal profesional. Campos de aplicación: Superficies, suelos, paredes, mobiliario, equipos, etc... en locales públicos, vestuarios, superficies alrededor de las piscinas, duchas, baños, instalaciones deportivas, gimnasios, colegios, industria, comunidades de vecinos, hoteles, oficinas, hospitales, mataderos, lácteas, cármicas, hortofrutícolas, plantas embotelladoras, salas de transformación y de conservas, restaurantes, caterings e industrias alimentarias de todo tipo.

Forma de uso: Puede ser utilizado por cualquiera de los métodos usuales, pulverización, lavado e inmersión con producto previamente diluido en agua. Limpiar previamente las superficies a desinfectar. Como dosis orientativa para conseguir actividad bactericida aplicar el producto diluido al 1% y dejar las superficies humedecidas durante 5 minutos. Para conseguir actividad viricida aplicar diluido al 2% y dejar actuar durante 5 minutos. Para conseguir actividad fungicida aplicar el producto diluido al 2,5% en agua y dejar actuar al menos 15 minutos. Aclarar después con agua limpia aquellas superficies que vayan a entrar en contacto con alimentos.

Recomendaciones: Lote y fecha de caducidad: véase envase. Envases superiores a 5L, sólo pueden ser utilizados con conexión a un equipo de dosificación según apartado 15 del Registro. La aplicación del producto en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad